

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

PCT/JP 03/04681

14.04.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 4月15日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-111943

[ST.10/C]:

[JP2002-111943]

出 願 人

Applicant(s):

ハイトカルチャ株式会社

REC'D 06 JUN 2003

WIPO

PCT

BEST AVAILABLE COPY


**PRIORITY  
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 5月20日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3036762

【書類名】 特許願

【整理番号】 182556

【提出日】 平成14年 4月15日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C12N 15/87  
C12M 3/00  
C04B 38/00

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府泉佐野市土丸 1 9 1 2 番地 ハイトカルチャ株式  
会社内

【氏名】 赤井 龍男

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府泉佐野市土丸 1 9 1 2 番地 ハイトカルチャ株式  
会社内

【氏名】 鈴木 大輔

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府泉佐野市土丸 1 9 1 2 番地 ハイトカルチャ株式  
会社内

【氏名】 小島 智子

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府豊中市上野坂 1 - 1 0 - 2 2

【氏名】 小林 昭雄

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府吹田市佐竹台 4 - 4 - 2

【氏名】 福崎 英一郎

【特許出願人】

【識別番号】 594161884

【住所又は居所】 大阪府泉佐野市土丸 1 9 1 2 番地

【氏名又は名称】 ハイトカルチャ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100062144

【弁理士】

【氏名又は名称】 青山 葆

【選任した代理人】

【識別番号】 100086405

【弁理士】

【氏名又は名称】 河宮 治

【選任した代理人】

【識別番号】 100106231

【弁理士】

【氏名又は名称】 矢野 正樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013262

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0000064

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 植物形質転換用システム

【特許請求の範囲】

【請求項1】 その表面で植物種子を発芽・生育させる微多孔質体と、ここに植物種子は微多孔質体が有する連通孔の毛細管現象により保持された養水分を該微多孔質体の表面から吸収して発芽・生育し；

形質転換用遺伝子を保持する担体溶液とを含み、ここに生育した植物体を該担体溶液に浸漬してイン・プランタ (in planta) 法により形質転換することを特徴とする植物形質転換用器具。

【請求項2】 イン・プランタ法が減圧浸潤法であることを特徴とする請求項1記載の植物形質転換用器具。

【請求項3】 その各々の表面で植物種子を発芽・生育させる複数の微多孔質体と、該複数の微多孔質体を着脱可能に保持する保持手段とを含み、ここに植物種子は微多孔質体が有する連通孔の毛細管現象により保持された養水分を該微多孔質体の表面から吸収して発芽・生育し、ここに該保持手段に保持された複数の微多孔質体の表面に生育した複数の植物体を形質転換用遺伝子を保持する担体溶液に略同時に浸漬してイン・プランタ法により形質転換することを特徴とする植物形質転換用システム。

【請求項4】 イン・プランタ法が減圧浸潤法であることを特徴とする請求項3記載の植物形質転換用システム。

【請求項5】 養水分が微多孔質体と接して保持手段内に貯溜されている請求項3または4記載の植物形質転換用システム。

【請求項6】 さらに、養水分を貯溜する貯溜タンクと、微多孔質体と貯溜タンク内の養水分とを連絡する養水分供給手段とを含み、該養水分供給手段を介して貯溜タンク内の養水分が微多孔質体に供給される請求項3または4記載の植物形質転換用システム。

【請求項7】 微多孔質体が円筒形であって、その内壁表面で植物種子を発芽・生育させる請求項3～6いずれか1項記載の植物形質転換用システム。

【請求項8】 植物がドクゼリモドキ (Ammi majus)、タマネギ (Allium c

epa)、ニンニク (*Allium sativum*)、セロリ (*Apium graveolens*)、アスパラガス (*Asparagus officinalis*)、テンサイ (*Beta vulgaris*)、カリフラワー (*Brassica oleracea* var. *botrytis*)、メキャベツ (*Brassica oleracea* var. *gemmifera*)、キャベツ (*Brassica oleracea* var. *capitata*)、セイヨウアブラナ (*Brassica napus*)、ヒメウイキョウ (*Carum carvi*)、キク (*Chrysanthemum morifolium*)、ドクニンジン (*Conium maculatum*)、オウレン (*Coptis japonica*)、キクニガナ (*Cichorium intybus*)、カザリカボチャ (*Curcubita pepo*)、アメリカチョウセンアサガオ (*Datura meteloides*)、ニンジン (*Daucus carota*)、カーネーション (*Dianthus caryophyllus*)、ソバ (*Fagopyrum esculentum*)、ウイキョウ (*Foeniculum vulgare*)、イチゴ (*Fragaria chiloensis*)、ダイズ (*Glycine max*)、ヒヤシンス (*Hyacinthus orientalis*)、サツマイモ (*Ipomoea batatas*)、レタス (*Lactuca sativa*)、セイヨウミヤコグサ (*Lotus corniculatus*)、ミヤコグサ (*Lotus japonicus*)、トマト (*Lycopersicon esculentum*)、ムラサキウマゴヤシ (*Medicago sativa*)、タバコ (*Nicotiana tabacum*)、イネ (*Oryza sativa*)、パセリ (*Petroselinum hortense*)、エンドウ (*Pisum sativum*)、セイヨウバラ (*Rosa hybrida*)、ナス (*Solanum melongena*)、ジャガイモ (*Solanum tuberosum*)、コムギ (*Triticum aestivum*)、トウモロコシ (*Zea mays*)、サトウダイコン (*Beta vulgaris*)、ワタ (*Gossypium indicum*)、アブラナ (*Brassica campestris*)、アマ (*Linum usitatissimum*)、サトウキビ (*Saccharum officinarum*)、パパイア (*Carica papaya*)、ニホンカボチャ (*Cucurbita moschata*)、キュウリ (*Cucumis sativus*)、スイカ (*Citrullus vulgaris*)、メロン (*Cucumis melo*)、セイヨウカボチャ (*Cucurbita maxima*)などの有用植物、キンギョソウ (*Antirrhinum majus*)、シロイヌナズナ (*Arabidopsis thaliana*)、クロトン (*Codiaeum variegatum*)、シクラメン (*Cyclamen persicum*)、ポインセチア (*Euphorbia pulcherrima*)、ガーベラ (*Gerbera jamesonii*)、ヒマワリ (*Helianthus annuus*)、ゼラニウム (*Pelargonium hortorum*)、ペチュニア (*Petunia hybrida*)、セントポーリア (*Saintpaulia ionantha*)、セイヨウタンポポ (*Taraxacum officinale*)、トレニア (*Torenia fournieri*)、シロツメクサ (*Trifolium repens*)、シンビジウム属 (*Cymbidium*)などの

観賞植物、インドセンダン (*Azadirachta indica*)、ミカン属 (*Citrus*)、アラビアコーヒーノキ (*Coffea arabica*)、ユーカリ属 (*Eucalyptus*)、パラゴムノキ (*Hevea brasiliensis*)、セイヨウヒイラギ (*Ilex aquifolium*)、カラタチ (*Poncirus trifoliata*)、アーモンド (*Prunus amygdalus*)、カナダポプラ (*Populus canadensis*)、コノテガシワ (*Biota orientalis*)、スギ (*Cryptomeria japonica*)、ドイツトウヒ (*Picea abies*)、マツ属 (*Pinus*)、ブドウ (*Vitis vinifera*)、リンゴ (*Malus pumila*)、アンズ (*Prunus armeniaca*)、カキ (*Diospyros kaki*)、イチジク (*Ficus carica*)、ニホングリ (*Castanea crenata*)、セイヨウハコヤナギ (*Populus nigra*)、エゾウコギ (*Acanthopanax senticosus*) などの木本類よりなる群から選択される請求項 3～7 いずれか 1 項記載の植物形質転換用システム。

【請求項 9】 微多孔質体の表面で植物種子を発芽・生育させ、ここに植物種子は微多孔質体が有する連通孔の毛細管現象により保持された養水分を該微多孔質体の表面から吸収して生育し；ついで

該微多孔質体の表面に生育した植物体を形質転換用遺伝子を保持する担体溶液に浸漬してイン・プランタ法により形質転換することを含む植物形質転換方法。

【請求項 10】 イン・プランタ法が減圧浸潤法であることを特徴とする請求項 9 記載の植物形質転換方法。

【請求項 11】 複数の微多孔質体を保持手段に着脱可能に保持し；

各微多孔質体の表面に植物種子を播種し、ここに植物種子は微多孔質体内部が有する連通孔の毛細管現象により保持された養水分を該微多孔質体の表面から吸収して発芽・生育し；ついで

該保持手段に保持された複数の微多孔質体の表面に生育した複数の植物体を形質転換用遺伝子を保持する担体溶液に略同時に浸漬してイン・プランタ法により形質転換することを含む植物形質転換方法。

【請求項 12】 イン・プランタ法が減圧浸潤法であることを特徴とする請求項 11 記載の植物形質転換方法。

【請求項 13】 さらに、担体溶液に浸漬する前に、形質転換に好適な段階まで生育した植物体を有する微多孔質体のみを選抜して 1 の保持手段に保持して

、形質転換に付すことを含む請求項 1 1 または 1 2 記載の植物形質転換方法。

【請求項 1 4】 微多孔質体の一部分を選抜用薬剤を含有する養水分に浸漬し；

形質転換植物体から得られた植物種子を該微多孔質体の表面に播種し、ここに形質転換植物体は該選抜用薬剤に対する耐性遺伝子を含む少なくとも 1 の異型遺伝子で形質転換されており、ここに植物種子は微多孔質体内部が有する連通孔の毛細管現象により保持された選抜用薬剤を含有する養水分を該微多孔質体の表面から吸収して、親形質転換植物体の該異型遺伝子を保有する植物種子は発芽ないし生育することができ、親形質転換植物体の該異型遺伝子を保有しない植物種子は発芽ないし生育することができず；ついで

発芽ないし生育する能力を有する植物種子のみを選抜することを特徴とする親形質転換植物体の異型遺伝子を保有する植物種子の選抜方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、植物形質転換用器具および植物形質転換用システムならびに植物形質転換方法、より詳細にはイン・プランタ (in planta) 法による植物体の形質転換に好適な器具およびシステムならびに方法に関する。さらに、本発明は、親形質転換植物体の異型遺伝子を保有する植物種子の選抜方法にも関する。

【0 0 0 2】

【従来技術】

現在、高等植物における形質転換は、食糧増産のための育種改良や植物固有の有用物質生産の高速・効率化につながるとして大きな注目を集めている。その中でも、高等植物のモデル植物として特に研究が進められているシロイヌナズナおよびイネ、その他タバコなどでは簡便なイン・プランタ法による形質転換が盛んに行われ、研究・開発速度が高速化している。したがって、健全で高品質の植物体を質的および量的に安定して供給し得る、より厳密・簡便、かつより高速・効率的な実験、研究および開発方法が求められている。

【0 0 0 3】

## 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来行われている植物体のイン・プラント法による形質転換では、図1に示すように、植物栽培用ポットなどの容器に入れた培養土で生育させた植物体を用いるために、灌水などの環境管理が必要であった。また、1の容器は被験植物体の数、大きさに比して大きく、多数の植物体を生育するためには広いスペースや大型の環境制御設備が必要となり、比較的大きな研究施設でないと実験効率を向上させることができなかった。また、容器単位で植物体を形質転換しているため、形質転換時に植物体の生育度合いを細かく揃えた実験ができなかったり、担体溶液に浸漬するに適していない被験植物体もあり、実験効率が低かった。また、植物体は容器に植えた状態で形質転換用の溶液に浸漬するために、培養土も形質転換用の溶液に浸漬されたり、溶液に不純物が混入したり、培養土に溶液が浸潤するなどの不具合を生じることがあった。また、イン・プラント法のうち減圧浸潤法を用いる場合には、用いる減圧用チャンバーにも容積制限があるため、一回の操作で処理し得る植物体の数が制限されていた。さらに、形質転換後の順化处理にも特別なスペースを必要とし、開花・結実までの植物体の管理にミスが生じ易いという問題があった。

## 【0004】

また、従来、親形質転換植物体の異型遺伝子を保有する植物種子の選抜は、通常、異型遺伝子と同時に導入される薬剤耐性遺伝子の保有の有無について、種子が該薬剤を含有する選抜用培地で発芽ないし生育する能力を有するか否かを判定することにより行われ、その後、生育した植物体は培養土に植え替えられているが、複数の選抜を行う場合には、その都度、異なる選抜用培地に植物種子ないし植物体を移す煩雑な操作が必要であり、また、植物体を選抜用培地から培養土に植え替える際に根が切断されるという問題があった。さらに、従来の選抜方法では、植物体を複数の選抜用培地間でまたは選抜用の条件から通常の生育条件下に移行する際には急激な環境変化によるストレスがかかることも考えられるため、望ましくない。

上述のように、従来の培養土で生育させる植物体の形質転換法および親形質転換体の異型遺伝子を保有する植物種子の選抜方法では、厳密・簡便、かつより高



速・効率的な実験、研究および開発方法を行うことができなかった。

【0005】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、前記の問題点に鑑みて鋭意検討した結果、微多孔質体を介して形質転換用の植物体を生育させ、そのままイン・プランタ法による形質転換に付すことにより、また、形質転換植物体から得られた種子を選抜用培地に浸漬した微多孔質体上で発芽、生育させることにより前記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0006】

すなわち、本発明は、第1の態様において、

その表面で植物種子を発芽・生育させる微多孔質体と、ここに植物種子は微多孔質体が有する連通孔の毛細管現象により保持された養水分を該微多孔質体の表面から吸収して発芽・生育し；

形質転換用遺伝子を保持する担体溶液とを含み、ここに生育した植物体を該担体溶液に浸漬してイン・プランタ (in planta) 法により形質転換することを特徴とする植物形質転換用器具を提供する。

【0007】

本発明の第1の態様によれば、植物体が微多孔質体の毛細管現象によって供給される養水分を吸収して生育するため、長期間、灌水などの環境管理が不要となる。また、土壌を必要としないため、1の植物体当りの占有面積を小さく抑えることができ、多数の植物体を効率よく生育させ、また、効率よく形質転換に付すことができる。また、1の植物体単位で独立して生育し得るため、生育度合いを細かく揃えた植物体を選抜して形質転換に付する実験が可能となる。また、土壌などの流動性の媒体を用いないため、形質転換用の溶液に不純物が混入することなく、厳密な実験を行うことができる。

【0008】

また、本発明は、第2の態様において、

イン・プランタ法が減圧浸潤法であることを特徴とする第1の態様の植物形質転換用器具を提供する。

本発明の第 2 の態様によれば、第 1 の態様における植物体の形質転換効率をさらに高めることができる。

【 0 0 0 9 】

また、本発明は、第 3 の態様において、

その各々の表面で植物種子を発芽・生育させる複数の微多孔質体と、該複数の微多孔質体を着脱可能に保持する保持手段とを含み、ここに植物種子は微多孔質体が有する連通孔の毛細管現象により保持された養水分を該微多孔質体の表面から吸収して発芽・生育し、ここに該保持手段に保持された複数の微多孔質体の表面に生育した複数の植物体を形質転換用遺伝子を保持する担体溶液に略同時に浸漬してイン・プランタ法により形質転換することを特徴とする植物形質転換用システムを提供する。

本発明の第 3 の態様によれば、上述した第 1 の態様の利点に加えて、複数の植物体を平行して同時に形質転換に付する実験が可能となるため、より高速・効率的な実験を行うことができる。

【 0 0 1 0 】

また、本発明は、第 4 の態様において、

イン・プランタ法が減圧浸潤法であることを特徴とする第 3 の態様の植物形質転換用システムを提供する。

本発明の第 4 の態様によれば、第 3 の態様における植物体の形質転換効率をさらに高めることができる。

【 0 0 1 1 】

また、本発明は、第 5 の態様において、

養水分が微多孔質体と接して保持手段内に貯溜されている第 3 または 4 の態様の植物形質転換用システムを提供する。

本発明の第 5 の態様によれば、養水分を保持手段に貯溜し得るため、微多孔質体と保持手段のみでシステムを構成し得、したがってより簡便かつ単純なシステム構成とし、より簡便、小スペースかつより効率的な実験を行うことができる。

【 0 0 1 2 】

また、本発明は、第 6 の態様において、

さらに、養水分を貯溜する貯溜タンクと、微多孔質体と貯溜タンク内の養水分とを連絡する養水分供給手段とを含み、該養水分供給手段を介して貯溜タンク内の養水分が微多孔質体に供給される第3または4の態様の植物形質転換用システムを提供する。

本発明の第6の態様によれば、第3の態様の利点に加えて、微多孔質体のサイズおよび養水分容量等の要件が緩和され、例えば短い微多孔質体であっても養水分供給手段を介して貯溜タンクから養水分を供給することができ、微多孔質体をより小型化することができ、また、より簡便に実験を行うことができる。

・【0013】

また、本発明は、第7の態様において、

微多孔質体が円筒形であって、その内壁表面で植物種子を発芽・生育させる第3～6いずれか1の態様の植物形質転換用システムを提供する。

本発明の第7の態様によれば、1の微多孔質体当りの占有面積をより小さく抑えることができ、小スペースで多数の植物体を効率よく生育させ、また、効率よくイン・プランタ法に付することができる。

【0014】

また、本発明は、第8の態様において、

植物がドクゼリモドキ (*Ammi majus*)、タマネギ (*Allium cepa*)、ニンニク (*Allium sativum*)、セロリ (*Apium graveolens*)、アスパラガス (*Asparagus officinalis*)、テンサイ (*Beta vulgaris*)、カリフラワー (*Brassica oleracea* var. *botrytis*)、メキャベツ (*Brassica oleracea* var. *gemmifera*)、キャベツ (*Brassica oleracea* var. *capitata*)、セイヨウアブラナ (*Brassica napus*)、ヒメウイキョウ (*Carum carvi*)、キク (*Chrysanthemum morifolium*)、ドクニンジン (*Conium maculatum*)、オウレン (*Coptis japonica*)、キクニガナ (*Cichorium intybus*)、カザリカボチャ (*Curcubita pepo*)、アメリカチヨウセンアサガオ (*Datura meteloides*)、ニンジン (*Daucus carota*)、カーネーション (*Dianthus caryophyllus*)、ソバ (*Fagopyrum esculentum*)、ウイキョウ (*Foeniculum vulgare*)、イチゴ (*Fragaria chiloensis*)、ダイズ (*Glycine max*)、ヒヤシンス (*Hyacinthus orientalis*)、サツマイモ (*Ipomoea batatas*)

、レタス (*Lactuca sativa*)、セイヨウミヤコグサ (*Lotus corniculatus*)、ミヤコグサ (*Lotus japonicus*)、トマト (*Lycopersicon esculentum*)、ムラサキウマゴヤシ (*Medicago sativa*)、タバコ (*Nicotiana tabacum*)、イネ (*Oryza sativa*)、パセリ (*Petroselinum hortense*)、エンドウ (*Pisum sativum*)、セイヨウバラ (*Rosa hybrida*)、ナス (*Solanum melongena*)、ジャガイモ (*Solanum tuberosum*)、コムギ (*Triticum aestivum*)、トウモロコシ (*Zea mays*)、サトウダイコン (*Beta vulgaris*)、ワタ (*Gossypium indicum*)、アブラナ (*Brassica campestris*)、アマ (*Linum usitatissimum*)、サトウキビ (*Saccharum officinarum*)、パパイア (*Carica papaya*)、ニホンカボチャ (*Cucurbita moschata*)、キュウリ (*Cucumis sativus*)、スイカ (*Citrullus vulgaris*)、メロン (*Cucumis melo*)、セイヨウカボチャ (*Cucurbita maxima*) などの有用植物、キンギョソウ (*Antirrhinum majus*)、シロイヌナズナ (*Arabidopsis thaliana*)、クロトン (*Codiaeum variegatum*)、シクラメン (*Cyclamen persicum*)、ポインセチア (*Euphorbia pulcherrima*)、ガーベラ (*Gerbera jamesonii*)、ヒマワリ (*Helianthus annuus*)、ゼラニウム (*Pelargonium hortorum*)、ペチュニア (*Petunia hybrida*)、セントポーリア (*Saintpaulia ionantha*)、セイヨウタンポポ (*Taraxacum officinale*)、トレニア (*Torenia fournieri*)、シロツメクサ (*Trifolium repens*)、シンビジウム属 (*Cymbidium*) などの観賞植物、インドセンダン (*Azadirachta indica*)、ミカン属 (*Citrus*)、アラビアコーヒーノキ (*Coffea arabica*)、ユーカリ属 (*Eucalyptus*)、パラゴムノキ (*Hevea brasiliensis*)、セイヨウヒイラギ (*Ilex aquifolium*)、カラタチ (*Poncirus trifoliata*)、アーモンド (*Prunus amygdalus*)、カナダポプラ (*Populus canadensis*)、コノテガシワ (*Biota orientalis*)、スギ (*Cryptomeria japonica*)、ドイツトウヒ (*Picea abies*)、マツ属 (*Pinus*)、ブドウ (*Vitis vinifera*)、リンゴ (*Malus pumila*)、アンズ (*Prunus armeniaca*)、カキ (*Diospyros kaki*)、イチジク (*Ficus carica*)、ニホングリ (*Castanea crenata*)、セイヨウハコヤナギ (*Populus nigra*)、エゾウコギ (*Acanthopanax senticosus*) などの木本類よりなる群から選択される第3～7いずれか1の態様の植物形質転換用システムを提供する。

本発明の第 8 の態様によれば、形質転換を利用する研究が現在盛んに行われている植物体についてより高速・効率的な実験を行うことができる。

【 0 0 1 5 】

また、本発明は、第 9 の態様において、

微多孔質体の表面で植物種子を発芽・生育させ、ここに植物種子は微多孔質体が有する連通孔の毛細管現象により保持された養水分を該微多孔質体の表面から吸収して生育し；ついで

該微多孔質体の表面に生育した植物体を形質転換用遺伝子を保持する担体溶液に浸漬してイン・プランタ法により形質転換することを含む植物形質転換方法を提供する。

本発明の第 9 の態様によれば、第 1 の態様において記載したような利点を有する植物形質転換方法を提供し得る。

【 0 0 1 6 】

また、本発明は、第 1 0 の態様において、

イン・プランタ法が減圧浸潤法であることを特徴とする第 9 の態様の植物形質転換方法を提供する。

本発明の第 1 0 の態様によれば、第 2 の態様において記載したような利点を有する植物形質転換方法を提供し得る。

【 0 0 1 7 】

また、本発明は、第 1 1 の態様において、

複数の微多孔質体を保持手段に着脱可能に保持し；

各微多孔質体の表面に植物種子を播種し、ここに植物種子は微多孔質体内部が有する連通孔の毛細管現象により保持された養水分を該微多孔質体の表面から吸収して発芽・生育し；ついで

該保持手段に保持された複数の微多孔質体の表面に生育した複数の植物体を形質転換用遺伝子を保持する担体溶液に略同時に浸漬してイン・プランタ法により形質転換することを含む植物形質転換方法を提供する。

本発明の第 1 1 の態様によれば、第 3 の態様において記載したような利点を有する植物形質転換方法を提供し得る。

【 0 0 1 8 】

また、本発明は、第 1 2 の態様において、  
イン・プラント法が減圧浸潤法であることを特徴とする第 1 1 の態様の植物形質転換方法を提供する。

本発明の第 1 2 の態様によれば、第 4 の態様において記載したような利点を有する植物形質転換方法を提供し得る。

【 0 0 1 9 】

また、本発明は、第 1 3 の態様において、

さらに、担体溶液に浸漬する前に、形質転換に好適な段階まで生育した植物体を有する微多孔質体のみを選抜して 1 の保持手段に保持して、形質転換に付すことを含む第 1 1 または 1 2 の態様の植物形質転換方法を提供する。

本発明の第 1 3 の態様によれば、生育段階の揃った植物体のみを形質転換実験に付すことができ、より厳密な実験を行うことができる。

【 0 0 2 0 】

さらに、本発明は、第 1 4 の態様において、

微多孔質体の一部分を選抜用薬剤を含有する養水分に浸漬し；

形質転換植物体から得られた植物種子を該微多孔質体の表面に播種し、ここに形質転換植物体は該選抜用薬剤に対する耐性遺伝子を含む少なくとも 1 の異型遺伝子で形質転換されており、ここに植物種子は微多孔質体内部が有する連通孔の毛細管現象により保持された選抜用薬剤を含有する養水分を該微多孔質体の表面から吸収して、親形質転換植物体の該異型遺伝子を保有する植物種子は発芽ないし生育することができ、親形質転換植物体の該異型遺伝子を保有しない植物種子は発芽ないし生育することができず；ついで

発芽ないし生育する能力を有する植物種子のみを選抜することを特徴とする親形質転換植物体の異型遺伝子を保有する植物種子の選抜方法を提供する。

本発明の第 1 4 の態様によれば、微多孔質体を浸漬する選抜用の養水分を取り換えるだけで異型接合体遺伝子を保有する種子ないし植物体を複数の選抜に簡便に付すことができ、培養土に植え替える必要がないため生育した植物体の根が切断されることもなく、また、異なる選抜に付す場合にも選抜用の養水分が微多孔

質体内で徐々に置換されるため種子ないし植物体に急激な環境変化によるストレスがかかることもなく、親形質転換植物の異型遺伝子を保有する種子ないし植物体を厳密・簡便、かつより高速・効率的に選抜することができる。

#### 【0021】

なお、本明細書中にて「植物種子」とは、未発芽状態の植物の種をいい、また「植物体」とは、発芽後の植物からイン・プラント法による形質転換に好適な段階まで生育した植物までをいい、単に「植物」という場合はこれら植物種子および植物体を包含することを意味する。さらに、「形質転換植物体」とは、本発明の形質転換方法または当該技術分野で知られているいずれか他の形質転換方法により異型遺伝子が導入された植物体をいう。

#### 【0022】

また、本明細書中にて「担体溶液」とは、イン・プラント法により植物体を形質転換し得る、特定の異型遺伝子を担持するプラスミドベクターを含む細菌、ウイルスなどの担体の懸濁液またはホモジネートをいい、例えば、アグロバクテリウム・ツメファシエンス (*Agrobacterium tumefaciens*)、アグロバクテリウム・リゾゲネス (*Agrobacterium rhizogenes*) の懸濁液などが挙げられ、この担体溶液には、例えば緩衝剤、浸透圧調整剤、pH調整剤、表面活性剤、植物成長調節剤などの植物体のイン・プラント法による形質転換に好適な添加剤を含有させることができる。また、形質転換方法としては、イン・プラント法のうち減圧浸潤法を用いることにより、植物体の形質転換効率をさらに高めることができ、その場合においても同様の添加剤を含有させることができ、同様の担体を用いることができる。

また、本明細書中にて「上端」および「下端」という場合は、各々、微多孔質体の植物種子を設置する側およびそれと対峙する側の部分をいう。

#### 【0023】

##### 【実施例】

つぎに、図2～14に参照して本発明の実施形態を説明する。なお、本発明の植物形質転換用器具は、本発明の植物形質転換用システムで用いる微多孔質体および担体溶液にも相当するため、ここでは主として植物形質転換用システムを説

明し、併せて植物形質転換用器具および植物形質転換法ならびに植物種子の選抜方法を説明する。

## 【0024】

まず、図2においては、その表面で植物種子を発芽・生育させる微多孔質体（1）が示されており、ここにおいて微多孔質体は円筒形の態様で図示されており、養水分などを十分に供給した後に端部付近の内側表面に植物種子を播種して植物種子を発芽・生育させる。微多孔質体の内部は連通孔からなり、微多孔質体の一部分に養水分が供給されれば、毛細管現象により連通孔を通して微多孔質体の全体にわたって養水分が供給されて内部に保持される。微多孔質体の表面に播種された種子は、その微多孔質体の内部に保持された養水分を該微多孔質体の表面から吸収することにより発芽・生育する。

## 【0025】

また、図2には、複数の上記微多孔質体（1）を着脱可能に保持し得る保持手段（2）が示されており、ここにおいて保持手段（2）には、円筒形の微多孔質体を着脱可能に保持することができるように、微多孔質体の外径と略同じ内径を有する孔（3）が設けられており、一方、微多孔質体の1の端部にはテーパ（4）およびリング（5）が設けられている。これらのテーパ（4）およびリング（5）を設けることにより、微多孔質体の外径および保持手段の孔の内径が高い寸法誤差で作成されていない場合でも、微多孔質体（1）を孔（3）に挿嵌して両者を一定の位置で確実に保持することができる。さらに、挿嵌後、保持手段（2）の下側から図示していないもう1のリングを微多孔質体の下端から通してリング（5）と共に保持手段（2）を挟持することにより、反転等した際にも微多孔質体（1）の保持手段（2）上の位置がずれることなく、確実に保持することができる。これらのテーパおよびリングは、微多孔質体（1）と同じ材料からなるものであってもよく、樹脂などの材質からなるものであってもよく、あるいはテーパ（4）およびリング（5）については微多孔質体自体をこれらの形状に一体成型してもよい。本発明の植物形質転換用システムは、少なくともこれらの微多孔質体と保持手段とからなる。

## 【0026】



つぎに、図3に図示するように、前記のように保持手段(2)の孔(3)に挿入した複数の微多孔質体(1)の一部分を貯溜タンク(6)に貯めた養水分(7)に浸漬して、微多孔質体の全体にわたって養水分を供給させた後に、微多孔質体(1)の上端付近の内側表面に植物種子を播種し、その植物の通常の発芽・生育条件下でインキュベートすることにより発芽・生育させる。なお、この実施形態においては、保持手段(2)のサイズと貯溜タンク(6)のサイズとを略合致させることによって、微多孔質体を保持手段に安定して設置している。

【0027】

また、もう1の実施形態として、図4に図示するように、微多孔質体(1)に係止手段(8)と共に養水分供給手段(9)を付設して、その養水分供給手段を介して養水分を間接的に微多孔質体に供給することもできる。かかる係止手段(8)は、好ましくは、発泡スチロール、発泡ポリウレタン、発泡ポリエチレンなどの収縮・反発力を有する素材、またはポリプロピレン、ポリエチレンなどの素材で構成され、養水分供給手段の養水分供給能力を低下せずに養水分供給手段を微多孔質体に係止し得る素材、構造を有する。また、養水分供給手段(9)は、略垂直に微多孔質体から懸架してその他端を養水分に浸漬した場合にも養水分を微多孔質体に供給し得る材質、形状からなり、好ましくは、紐形のポリビニルアルコールのような連続気泡型発泡プラスチックや、グラスファイバー、炭素繊維、アクリル繊維などの繊維束や不織布からなる。

【0028】

また、もう1の実施形態として、図5に示す植物形質転換用システムにおいては、微多孔質体(1)の下端を圧入することにより着脱可能に保持することができる形態の保持手段(30)に保持された複数の微多孔質体(1)が示されており、ここにおいて保持手段にはテーパ状凹部(10)が設けられており、そこに一端を圧入することによって微多孔質体(1)が保持される。また、保持手段(30)のテーパ状凹部(10)に養水分を貯溜することにより養水分が直接的に微多孔質体に供給され、微多孔質体(1)および保持手段(30)のみからなる植物形質転換システムを構成することができる。あるいは、テーパ状凹部の底部が開口され、微多孔質体を保持した保持手段を、ここに図示しない一定量の養水分が貯

溜された貯溜タンクに浸漬または浮遊させることもできる。

【0029】

つぎに、前記したような実施形態で植物種子を播種し、発芽させ、形質転換に好適な段階まで生育した植物体を選抜し、イン・プランタ法による形質転換に付すまでの一連の工程を説明する。

図6に示す一連の植物形質転換工程には、複数の微多孔質体を保持手段に着脱可能に圧入して保持手段のテーパ状凹部に養水分を分注する工程(I)、養水分が全体に供給された各微多孔質体表面に植物種子を播種する工程(II)、植物種子を発芽・生育させる工程(III)、一定期間経過後、植物体を成長段階に応じてグループ別けする工程(IV)、形質転換に好適なグループのみを選抜する工程(V)、ついで選抜したグループの植物体を保持手段と一緒に反転させて、担体溶液に浸漬して形質転換する工程(VI)が含まれる。ここにおいては、保持手段として前記したテーパ状凹部を有するものを用いた形態を示しているが、保持手段は複数の微多孔質体を保持し得るものであればいずれの形態であってもよい。

なお、形質転換された植物体の確認は、遺伝子工学の分野の当業者によく知られているいずれの方法によっても確認することもできるが、好ましくは、ある種の薬剤選択マーカーを予め担体に含ませ、ついで得られた種子をその薬剤を含有する培地で生育する能力について選抜することにより確認することができる。

【0030】

かかる本発明に用いる微多孔質体は、前記したようにその一部に接触した養水分を毛細管現象によって内部の連通孔を介してその全体の内部に供給して保持し得るものであれば、特に限定されるものではないが、20℃において通常0.05～0.5(重量/重量)倍量、好ましくは0.05～0.3倍量、より好ましくは0.1～0.2倍量の水を保持し得る吸水能を有し、通常0.2～900 $\mu$ m、好ましくは0.2～80 $\mu$ m、さらに好ましくは0.2～9 $\mu$ m、最も好ましくは0.2～3 $\mu$ mの孔隙径の連通する孔を、通常0.05～1、好ましくは0.1～0.4、より好ましくは0.2～0.3の孔隙率(体積/体積)で有する微多孔質体が好ましい。

## 【 0 0 3 1 】

このような微多孔質体は、例えば 10 号土、磁器 2 号土（城山セラポット株式会社）、村上粘土（新潟県産）などの非金属無機質固体原料などを通常の方法に従って混練、成型、焼成することによって得られる微多孔質体や、ポリビニルアルコールフォーム、ポリウレタンフォーム、ポリスチレンフォーム、塩化ビニル樹脂フォーム、ポリエチレンフォーム、ポリプロピレンフォーム、フェノール樹脂フォーム、ユリア樹脂フォームなどの連続気泡型プラスチックフォーム材料を材質とするものが挙げられる。特に、非金属無機質固体原料を、微多孔質であって、水分を吸収および放出し易い微多孔質体とする場合には、例えば、ペタライト、アルミナなどを 50～60 重量%含有させて焼成することが好ましい。なお、一般的に、前記のペタライトとしては、通常 70～90 重量%、好ましくは 75～85 重量%、より好ましくは 75～80 重量%の  $\text{SiO}_2$ 、通常 10～20 重量%、好ましくは 12～18 重量%、より好ましくは 15～17 重量%の  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、通常 2～5 重量%、好ましくは 3～4.5 重量%、より好ましくは 3.5～4.2 重量%の  $\text{LiO}_2$ 、通常 0.1～0.5 重量%、好ましくは 0.2～0.5 重量%、より好ましくは 0.3～0.45 重量%の  $\text{K}_2\text{O}$ 、および通常 0.5～2 重量%、好ましくは 0.7～1.8 重量%、より好ましくは 0.8～1.6 重量%の不可避的不純物を含むものが好ましい。また、非金属無機質固体原料には、粉状無機質発泡体を含有させておいてもよい。さらに、本発明に用いる微多孔質体は、吸水した場合においても実質的にその強度が低下しない非金属無機質からなっている。また、吸水した場合においても実質的にその強度が低下しない非金属無機質からなっている。

## 【 0 0 3 2 】

非金属無機質固体原料の成型方法としては、例えば、鋳込み成型、押し出し成型、プレス成型、ろくろ成型などの当該技術分野で知られている成型方法が挙げられるが、特に大量生産およびコスト削減の見地から押し出し成型が好ましい。また、成型後の乾燥は、当該技術分野で知られている通常の方法および条件を用いて行うことができる。つづく成型体の焼成は、通常行われている条件および方法であれば特に限定されるものではないが、例えば、所望の孔隙が得られやすい酸化焼成などを選択し得、焼成温度は 1000℃～2000℃、好ましくは 11

00℃～1500℃、より好ましくは1150～1300℃、最も好ましくは1200℃付近である。非金属無機質固体原料の焼成温度が1000℃未満である場合には硫黄成分が残留し易く、一方、2000℃を超える場合には所望の吸水性が得られない。

#### 【0033】

一方、連続気泡型プラスチックフォームを材質とする微多孔質体の成型方法としては、例えば、溶融発泡成型、固相発泡成型、注型発泡成型などの方法が挙げられる。

溶融発泡成型の主な工程は、溶融混練、未発泡シート成型、加熱発泡または押し出し発泡、冷却、裁断および加工である。固相発泡成型では、ポリマーを固相または固相に近い状態で発泡させる。また、注型発泡成型では、液体原料（モノマーまたはオリゴマー）を使用して大気中で反応させながら注型して発泡させる。また、連続気泡型プラスチックフォームを発泡させるためには、一般的に発泡剤が用いられる。

#### 【0034】

また、微多孔質体は、対象となる植物の種類や使用状況に応じていずれの形状とすることもできるが、好ましくは、円筒形、平板形、柱状形、有底円筒形、蜂の巣状断面を有する柱状体、多角形断面を有する筒形（例えば、六角筒や四角筒）のような形状とすることができる。

#### 【0035】

つぎに、本発明に用いる保持手段は、前記微多孔質体を挿嵌または圧入などにより保持して、前記したように植物体を担体溶液に浸漬してイン・プランタ法により形質転換し得るものであればいずれの材料および形状からなるものであってもよいが、好ましくは、前記したように孔またはテーパ状凹部を有する板状の発泡スチロール、発泡ポリエチレン、発泡ポリウレタンからなるものとし得る。また、保持手段は、弾力性を有して微多孔質体を繰返して着脱可能に保持し得る材質のものが好ましい。また、保持手段は、図7に示すような反転して担体溶液に植物体を浸漬する間水に浮く比重を有するものが好ましい。このような特性を有する保持手段を用いることにより、本発明の植物形質転換用システムを別の手段

によって保持する必要なしに担体溶液に浮かべて植物体を担体溶液に浸漬し、イン・プランタ法に付すことができる。

しかしながら、本発明の植物形質転換用システムにおいては、ここに図示していない別の輸送手段によって微多孔質体を保持する保持手段が担体溶液の上方まで運動され、そこで同輸送手段によって反転され、下降して担体溶液に浸漬されることも意図する。

#### 【0036】

さらに、別の実施形態において、本発明に用いる保持手段は、図8に示すように微多孔質体を側方から装着し得る部分円筒状凹部を有する保持手段(40)とすることができる。この実施形態においては、微多孔質体を挿嵌した保持手段を上下反転させた後に、図9に示すような案内板(11)および係止部(12)を有し、担体溶液を入れたタンク(担体溶液タンク)に挿嵌することにより複数の植物体を略同時に浸漬することができる。

#### 【0037】

また、別の実施形態において、本発明に用いる保持手段は、図10に示すようなフック(13)または磁石(14)を付装したキャップを介して複数の微多孔質体を懸架し得るものとすることができる。

また、別の実施形態において、本発明に用いる保持手段は、図11に示すように、微多孔質体の外径サイズと略同じ口径を有する凹部(15)が表面に設けられた平板状の保持手段(50)とすることができる。この形態においては、この凹部に微多孔質体の下端を挿嵌して、1の板状体に複数の微多孔質体に保持することができる。さらに、このように複数の微多孔質体を保持した保持手段は、反対側に設けられたフックにより懸架して、複数の微多孔質体上の植物体を担体溶液に略同時に浸漬することができる。

#### 【0038】

また、別の実施形態において、本発明に用いる保持手段は、図12に示すように、微多孔質体係入部(16)およびピン(17)を有するキャップ(18)とそのピンを案内することにより該キャップと嵌合して微多孔質体を安定に保持できる案内溝(19)を有する凹部(20)を凸設した平板からなる。この実施形

態においても、複数の微多孔質体を保持した保持手段は、ここに図示していない反対側に設けられたフックにより懸架することができる。なお、流通・輸送時を考慮すると、フックは着脱可能なものが好ましい。

## 【 0 0 3 9 】

また、別の実施形態において、本発明に用いる保持手段は、図 1 3 に示すように、複数の微多孔質体の側部を拘持する保持手段（60）とすることができる。この実施形態の保持手段には微多孔質体（1）が抜け落ちないように拘持し得る波状のツメが設けられている。また、この実施形態の保持手段には微多孔質体を支持する労力を軽減し、また植物体を浸漬する際には貯溜タンクの側壁に載置できるような翼部（21）が設けられている。

## 【 0 0 4 0 】

さらに、本発明においては、植物体を形質転換用遺伝子を保持する担体溶液に浸漬する際には、前記したごとく実施形態における植物体を発芽・生育させた微多孔質体を保持手段から離脱して、これを図 1 4 に示すような担体溶液タンク（70）の斜面（22）に載置して植物体をイン・プランタ法による形質転換に付すこともできる。この担体溶液タンクの斜面端部には係止板（23）が設けられており、斜面に載置した微多孔質体を一定の位置に係止しつつ植物体を担体溶液に浸漬することができる。

## 【 0 0 4 1 】

このように本発明の植物形質転換用システムの対象となる植物の例としては、イン・プランタ法または減圧浸潤法により形質転換し得る植物であれば特に限定されるものではないが、好ましくは、ドクゼリモドキ (*Ammi majus*)、タマネギ (*Allium cepa*)、ニンニク (*Allium sativum*)、セロリ (*Apium graveolens*)、アスパラガス (*Asparagus officinalis*)、テンサイ (*Beta vulgaris*)、カリフラワー (*Brassica oleracea* var. *botrytis*)、メキャベツ (*Brassica oleracea* var. *gemmifera*)、キャベツ (*Brassica oleracea* var. *capitata*)、セイヨウアブラナ (*Brassica napus*)、ヒメウイキョウ (*Carum carvi*)、キク (*Chrysanthemum morifolium*)、ドクニンジン (*Conium maculatum*)、オウレン (*Coptis japonica*)、キクニガナ (*Cichorium intybus*)、カザリカボチャ (*Curcubit*

a pepo)、アメリカチョウセンアサガオ (*Datura meteloides*)、ニンジン (*Daucus carota*)、カーネーション (*Dianthus caryophyllus*)、ソバ (*Fagopyrum esculentum*)、ウイキョウ (*Foeniculum vulgare*)、イチゴ (*Fragaria chiloensis*)、ダイズ (*Glycine max*)、ヒヤシンス (*Hyacinthus orientalis*)、サツマイモ (*Ipomoea batatas*)、レタス (*Lactuca sativa*)、セイヨウミヤコグサ (*Lotus corniculatus*)、ミヤコグサ (*Lotus japonicus*)、トマト (*Lycopersicon esculentum*)、ムラサキウマゴヤシ (*Medicago sativa*)、タバコ (*Nicotiana tabacum*)、イネ (*Oryza sativa*)、パセリ (*Petroselinum hortense*)、エンドウ (*Pisum sativum*)、セイヨウバラ (*Rosa hybrida*)、ナス (*Solanum melongena*)、ジャガイモ (*Solanum tuberosum*)、コムギ (*Triticum aestivum*)、トウモロコシ (*Zea mays*)、サトウダイコン (*Beta vulgaris*)、ワタ (*Gossypium indicum*)、アブラナ (*Brassica campestris*)、アマ (*Linum usitatissimum*)、サトウキビ、 (*Saccharum officinarum*)、パパイア (*Carica papaya*)、ニホンカボチャ (*Cucurbita moschata*)、キュウリ (*Cucumis sativus*)、スイカ (*Citrullus vulgaris*)、メロン (*Cucumis melo*)、セイヨウカボチャ (*Cucurbita maxima*)などの有用植物、キンギョソウ (*Antirrhinum majus*)、シロイヌナズナ (*Arabidopsis thaliana*)、クロトン (*Codiaeum variegatum*)、シクラメン (*Cyclamen persicum*)、ポインセチア (*Euphorbia pulcherrima*)、ガーベラ (*Gerbera jamesonii*)、ヒマワリ (*Helianthus annuus*)、ゼラニウム (*Pelargonium hortorum*)、ペチュニア (*Petunia hybrida*)、セントポーリア (*Saintpaulia ionantha*)、セイヨウタンポポ (*Taraxacum officinale*)、トレニア (*Torenia fournieri*)、シロツメクサ (*Trifolium repens*)、シンビジウム属 (*Cymbidium*)などの観賞植物、インドセンダン (*Azadirachta indica*)、ミカン属 (*Citrus*)、アラビアコーヒーノキ (*Coffea arabica*)、ユーカリ属 (*Eucalyptus*)、パラゴムノキ (*Hevea brasiliensis*)、セイヨウヒイラギ (*Ilex aquifolium*)、カラタチ (*Poncirus trifoliata*)、アーモンド (*Prunus amygdalus*)、カナダポプラ (*Populus canadensis*)、コノテガシワ (*Biota orientalis*)、スギ (*Cryptomeria japonica*)、ドイツトウヒ (*Picea abies*)、マツ属 (*Pinus*)、ブドウ (*Vitis vinifera*)、リンゴ (*Malus pumila*)、アンズ (*Prunus armeniaca*)

、カキ (*Diospyros kaki*)、イチジク (*Ficus carica*)、ニホングリ (*Castanea crenata*)、セイヨウハコヤナギ (*Populus nigra*)、エゾウコギ (*Acanthopanax senticosus*)などの木本類などが挙げられる。

【0042】

また、本発明で用いる養水分とは、水、または植物種子を発芽・生育させるために必要な硝酸態窒素、アンモニア態窒素、リン、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄およびマンガン、銅、亜鉛、モリブデン、ホウ素などの無機要素、チアミン、ピリドキシン、ニコチン酸、ビオチン、葉酸などの各種ビタミン、ココナットミルク、カゼイン加水分解物、酵母抽出物などの天然物質、グルタミン酸、アスパラギン酸、アラニンなどの有機窒素源、オーキシシン、サイトカイン、ジベレリンなどの植物生長調節物質、ブドウ糖、ショ糖、果糖、麦芽糖などの炭素源、カナマイシン、ハイグロマイシンなどの抗生物質、バスタなどの農薬などを含有する水溶液である。

【0043】

また、本発明で用いるイン・プランタ法および減圧浸潤法は、例えば、Bechtold N, Ellis J, Pelletier (1993) *In planta Agrobacterium mediated gene transfer by infiltration of adult Arabidopsis thaliana plants*. C. R. Acad. Sci. Paris, Life Sciences 316:1194-1199.や“モデル植物ラボマニュアル”、編者 岩淵雅樹、岡田清孝、島本功、シュプリンガー・フェアラーク東京株式会社、2000年4月13日発行に記載されているごとく行うことができる。減圧浸潤法の場合、簡単には、例えば、本発明による微多孔質体上で生育させた植物体を形質転換に好適な形態に整えた後、形質転換用の担体溶液に浸漬して減圧用チャンバーに入れ、減圧下にて所定時間（例えば、対象植物がシロイヌナズナの場合には、約400 mmHg（約50 kPa）にて4～12分）置き、その後、減圧を徐々に解除する。処理後、植物体は適当な順化条件に付して生育させ、常法により抗生物質などを含有する培地上で形質転換体を選抜し、所望により種子などを収獲し得る。

【0044】

【発明の効果】



本発明によれば、健全で高品質の植物体を質的および量的に安定して供給し得る、より厳密・簡便、かつより高速・効率的な実験、研究および開発に用いることができる植物形質転換用器具、植物形質転換用システムおよび植物形質転換方法ならびに親形質転換植物体の異型遺伝子を保有する植物種子の選抜方法が提供される。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 図 1 は、イン・プランタ法により植物体を形質転換するために従来用いられていた方法を示す図である。

【図 2】 図 2 は、本発明の 1 の実施形態の植物形質転換用システムを示す図である。

【図 3】 図 3 は、1 の保持手段に挿嵌された複数の微多孔質体を貯溜タンクに設置している本発明の 1 の実施形態の植物形質転換用システムを示す図である。

【図 4】 図 4 は、本発明の 1 の実施形態における養水分供給手段を付設した微多孔質体を示す部分断面図である。

【図 5】 図 5 は、テーバ状凹部を有する保持手段に複数の微多孔質体を挿嵌した本発明の 1 の実施形態の植物形質転換用システムを示す図である。

【図 6】 図 6 は、図 5 の実施形態の植物形質転換システムを用いて植物体をイン・プランタ法により形質転換する工程を示す図である。

【図 7】 図 7 は、本発明の 1 の実施形態の植物形質転換システムを用いて、担体溶液に浮遊させつつイン・プランタ法による植物体の形質転換を示す図である。

【図 8】 図 8 は、本発明の 1 の実施形態の植物形質転換システムを示す図である。

【図 9】 図 9 は、図 8 の植物形質転換システムおよびそれを挿嵌して植物体を担体溶液に浸漬する担体溶液タンクを示す図である。

【図 10】 図 10 は、微多孔質体を保持手段に懸架するためのフックおよび磁石を付装したキャップを示す図である。

【図 11】 図 11 は、本発明の 1 の実施形態の植物形質転換システムを示す図である。

す図である。

【図 1 2】 図 1 2 は、本発明の 1 の実施形態の植物形質転換用システムを示す図である。

【図 1 3】 図 1 3 は、本発明の 1 の実施形態の植物形質転換用システムを示す図である。


【図 1 4】 図 1 4 は、本発明の 1 の実施形態における担体溶液タンクを示す図である。

【符号の説明】

(1) …微多孔質体；(2) …保持手段；(3) …孔；(4) …テーパ；(5) …リング；(6) …貯溜タンク；(7) …養水分；(8) …係止手段；(9) …養水分供給手段；(10) …テーパ状凹部；(11) …案内板；(12) …係止部；(13) …フック；(14) …磁石；(15) …凹部；(16) …微多孔質体係入部；(17) …ピン；(18) …キャップ；(19) …案内溝；(20) …凹部；(21) …翼部；(22) …斜面；(23) …係止板；(30)、(40)、(50)、(60) …保持手段；(70) …担体溶液タンク


【書類名】 図面

【図 1】




形質転換


【図2】




【図 3】




【図 4】



【図 5】




【図 6】







【図7】




【図8】




【図9】




【図 1 0】




【図 1 1】





【図 12】



【図13】



【図14】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 厳密・簡便、かつより高速・効率的な実験、研究および開発方法を行うことができる植物形質転換用器具、植物形質転換用システムおよび植物形質転換方法ならびに親形質転換植物体の異型遺伝子を保有する植物種子の選抜方法を提供すること。

【解決手段】 その表面で植物種子を発芽・生育させる微多孔質体からなり、ここに植物種子は微多孔質体内部の連続気泡で形成された連通孔を毛細管現象により供給されてその内部に保持された養水分を該微多孔質体の表面から吸収して発芽・生育し、ここに生育した植物体を形質転換用遺伝子を保持する担体溶液に浸漬してイン・プランタ法により形質転換することを特徴とする植物形質転換用器具。

【選択図】 図2



出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [594161884]

1. 変更年月日 1996年 6月13日  
[変更理由] 名称変更  
住 所 大阪府泉佐野市土丸19-12番地  
氏 名 ハイトカルチャ株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**